



## INSTRUCCIONES

### DOS DIAS ANTES DEL LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% o Cosopt cada 8 horas
- Poner 1 gota de FML cada 8 horas

### CADA SESION DE LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% y 1 gota de FML cada hora durante las primeras 5 horas, y después cada 2-3 horas hasta media noche
- Tomar 1 Ibuprofeno/Enantyum después de comer a mediodía
- Mantener la cabeza alta las primeras 5 horas
- Descansar y no realizar ejercicios físicos, solo caminar
- Protegerse del calor y del sol
- Si hay dolor fuerte llamar al doctor: +34 696551011

### DESPUES DE TERMINAR LAS SESIONES DE LASER

- Poner 1 gota de Timolol 0.50% + FML 3 veces/día durante 10 días
- Poner 1 gota de Tropicamida antes de dormir durante 4-5 noches
- Consultar al doctor: +34 696551011

### DURANTE 3-4 MESES

- Poner lágrimas artificiales 3-4 veces/día
- Hyloparín, Isopto B12 o Visionlux

### DESPUES DE 2 MESES DEL LASER

- Enviar fotos de los ojos para control con App Eye Selfie
- Pedir cita para la siguiente fase con App MyNeweyes  
o por email info@eyecos.eu