Eyecos Clinic
Avenida Diagonal, 415. 1°
08008 Barcelona (Spain)

Telf: +34 938 10 22 50
Email: info@eyecos.eu
Web: eyecos.eu

INSTRUCTIONS

DEUX JOURS AVANT LE LASER

- Instiller 1 goutte de Timabak 5mg (ou Timolol 0,50% ou Cosopt)
- Instiller 1 goutte de Dicloabak (Diclofenaco ou Voltaren)

CHAQUE SESSION LASER

- Instiller 1 goutte de Timabak 5mg (ou Timolol 0,50% ou Cosopt) et 1 goutte de Dicloabak (Diclofenaco ou Voltaren) toutes les 2-3 heures jusqu'à la nuit
- Prendre 1 comprimé d' Ibuprofen/Enantyum après manger
- Gardez la tête haute pendant les 5 premières heures
- Reposez-vous et ne faites pas d'exercices physiques, juste marcher
- Protéger de la chaleur et du soleil
- S'il y a une forte douleur, appelez le docteur: +34 696551011

APRES FINIR LES SESSIONS LASER

- Mettre 1 goutte de Timabak 5 mg, Dicloabak et Simbrinza 3 fois par jour pendant 10 jours
- Mettre 1 goutte de Tropicamide juste avant d'aller dormir pendant 2 nuits
- Appeler le médecin : +34 696 551 011

PENDANT 3-4 MOIS

- Mettre Hyloparin 3–4 fois par jour

APRÈS 2 MOIS DU LASER

- Envoyer des photos des yeux pour contrôle via l'application Eye Selfie
- Demander la prochaine étape et le rendez-vous par email : info@eyecos.eu