



Eyecos Clinic
Calle Tuset, 23-25
08006 Barcelona (Spain)

Tel.: +34 938 10 22 50
Email: info@eyecos.eu
info.neweyeslaser.com

NEWEYESLASER
BY EYECOS

INSTRUCTIONS

DEUX JOURS AVANT LE LASER

- Instiller 1 goutte de Timolol 0.50% ou Cosopt chaque 8 heures
- Instiller 1 goutte de Tobradex ou Genta-Dexa ou Maxitrol chaque 8 heures

CHAQUE SESSION LASER

- Instiller 1 goutte de Timolol 0.50% et 1 goutte de Tobradex chaque heure pendant les premières 5 heures, et après chaque 2-3 heures jusqu'à minuit
- Prendre 1 comprimé d' Ibuprofen/Enantyum après manger
- Gardez la tête haute pendant les 5 premières heures
- Reposez-vous et ne faites pas d'exercices physiques, juste marcher
- Protéger de la chaleur et du soleil
- S'il y a une forte douleur, appelez le docteur: +34 696551011

APRES FINIR LES SESSIONS LASER

- Instiller 1 goutte de Timolol 0.50% + Tobradex 3 fois/jour pendant 10 jours
- Instiller 1 goutte de Tropicamida avant d'aller dormir pendant 4-5 nuits
- Appelez le doctor: +34 696551011

PENDANT 3-4 MOIS

- Instiller larmes artificielles 3-4 fois/jour
- Hyloparin, Isopto B12 ou Visionlux

APRÈS 2 MOIS DU LASER

- Envoyer des photos d'oeil avec App Eye Selfie pour contrôle
- Demander un rendez-vous pour la prochaine phase avec App MyNeweyes ou par email info@eyecos.eu